

**Suddivisione della popolazione in categorie di progressivo impegno clinico  
In base ai seguenti parametri:**

- Documentazione virologica
- Elevato sospetto clinico-epidemiologico
- valutazione obiettiva (parametri vitali: polso PA, FR, TC)
- valutazione delle comorbidità (età, patologie e terapie concomitanti)

**Stadio I: paziente pauci-sintomatico, non polmonite (MEWS 0-1)**

**Definizione:**

- TNF positive od  elevato sospetto clinico-epidemiologico
- febbre  $\leq 38,0$  °C
- PA e FC nella norma
- assenza di sintomi sistemici di disidratazione o sepsi
- tosse secca, rinite, faringodinia o diarrea lieve
- no dispnea
- pulsossimetria normale
- Ecografia (opzionale) negativa per polmonite

**Stadio II: polmonite lieve (MEWS 2-3)**

**Definizione:**

- TNF positive od  elevato sospetto clinico-epidemiologico
- febbre  $\geq 38$  °C
- FC < 90bpm, PA max > 100
- FR > 16 e < 28 atti/min
- tosse, dispnea da lieve a moderata
  
- pulsiossimetria non inferiore al 93%
- reperti obiettivi polmonari (crepitii fini bilaterali)
- Ecografia (opzionale) compatibile con polmonite lieve.

**LA TERAPIA DOMICILIARE (ALLEGATO 1) E' RACCOMANDATA NEI PAZIENTI CLASSIFICATI COME STADIO 1 E 2**